

阿蘇の土壌より生まれた

ポリオキシン[®]AL 水和剤「科研」

小菌核病、ネギアザミウマに
登録拡大

果樹・野菜用殺菌剤



**ポリオキシンは微生物を培養して得られる
化学合成を行わない天然物由来の殺菌剤です。**

**ポリオキシンは日本で唯一のキチン合成阻害による殺菌剤
組合せ自在でローテーションの一剤に最適!!**

製品ラベルの使用方法（登録作物、対象病害、使用量、使用時期、使用回数等）
を必ずお守りください。



科研製薬株式会社

ポリオキシン[®]AL 水和剤「科研」

種 類 名	ポリオキシン水和剤
登録番号	第9020号
有効期限	4 年

有効成分の種類および含有量／ポリオキシン複合体…10.0%(ポリオキシンBとして 100,000AmBu/g) 界面活性剤等…90.0%

特 長

- 天然物由来の殺菌剤です。
- 野菜のうどんこ病、灰色かび病、りんごの斑点落葉病、なしの黒斑病などに優れた予防及び治療効果を示します。
- 独自の作用性を有し、40年以上の長い実績があります。
- 他剤とのローテーションに最適です。

適用病害と使用方法

作 物 名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病	1,000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散 布	5回以内 (散布は3回以内)
	うどんこ病						
	褐 斑 病						
	赤 衣 病						
な し	黒 斑 病	500～1,000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内 (イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン水和剤は3回以内)
	うどんこ病						
	褐色斑点病						
ぶどう	灰色かび病	500～1,000倍		収穫60日前まで	5回以内		5回以内
みかん	赤 衣 病			収穫14日前まで			
メロン	うどんこ病	1,000倍		収穫前日まで	2回以内		5回以内(塗布は1回以内)
きゅうり							2回以内
いちご	灰色かび病	1,000倍		収穫開始14日前まで	3回以内		3回以内
	うどんこ病						
トマト	灰色かび病	500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
	葉 か び 病			収穫14日前まで			
レタス	菌 核 病	1,000倍		収穫7日前まで	20回以内(1年間に5回以内)	20回以内(1年間に5回以内)	
にんじん	黒 葉 枯 病			収穫30日前まで			
薬用にんじん	斑 点 病	500倍		収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
ね ぎ	黒 斑 病			発生初期但し、収穫14日前まで			
	ネギアザミウマ						
たまねぎ	灰色かび病	500～750倍		収穫3日前まで	5回以内	5回以内	
	小 菌 核 病 ネギアザミウマ	500倍					
からまつ	先 枯 病	500～1,000倍	300～700L/10a	—	8回以内	8回以内	
たばこ	赤 星 病		100～180L/10a	収穫5日前まで	2回以内	2回以内	
	灰色かび病						

△ 効果・薬害等の注意

- 果菜類に対し収穫間際の散布は注意してください(果実の汚れ) (平成27年4月現在)
- 過度の連用をさせ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください(耐性菌出現回避)
- ぶどうの着色期の散布はさけてください(果実の汚れ)
- レタスの菌核病に対しては、多発が予想される場合は、本病に効果の高い他剤との輪番使用をしてください(効果)
- ネギアザミウマに対しては、発生が多くなってからの使用では効果が劣るので、発生状況をよく確認の上、使用すること。

●ラベルをよく読む。 ●ラベルの記載以外には使用しない。 ●小児の手の届くところには置かない。 ●防除日誌を記載しましょう。



科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8
https://www.kaken.co.jp